

VOLET INTERNE RECTO (SIDE 7)

(SIDE 1)

FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

(SIDE 3)

FACE PRINCIPALE RECTO (SIDE 4)

(SIDE 5)

VOLET PRINCIPAL RECTO (SIDE 6)

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Η εφαρμογή (1 /έτος) να γίνεται πάντα προληπτικά.

Το picoxystrobin (στρομπιλουρίνη) ανήκει στα QoI μυκητοκτόνα / FRAC: group 11, με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός φυλλώματος όταν τα τηγάνια δεν έχουν νερό, χρησιμοποιώντας ψεκαστήρες κάλυψης τοποθετημένους σε τρακτέρ και κατευθυνόμενους στο έδαφος και όγκους που κυμαίνονται μεταξύ 200-400 L/ha.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ρύζι: 35 ημέρες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τον εξοπλισμό ψεκασμού πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε σε άλλες καλλιέργειες για να αποφύγετε τη ζημία των καλλιεργειών.

1. Αραιώστε τα αναπόφευκτα υπολείμματα στην αναλογία 1:10 με νερό και ψεκάστε ψεκασμένη περιοχή με τον αναδευτήρα σε λειτουργία.
2. Γεμίστε το δοχείο (20%) με καθαρό νερό και ξεπλύνετε καλά τις εσωτερικές επιφάνειες. Αφήστε τον αναδευτήρα να λειτουργεί για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ψεκάστε σε μια ήδη ψεκασμένη περιοχή.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2.
4. Αφαιρέστε τα ακροφύσια και τα πλευρικά χωρίσματα και καθαρίστε χωριστά σε ένα δοχείο που περιέχει το μέσο καθαρισμού (πχ. Οικιακή αμμωνία) και το νερό.
5. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή, τους βραχίονες και τους σωλήνες με καθαρό νερό.
6. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με καθαρό νερό ξεπλένοντας το νερό μέσα από τους σωλήνες και τον βραχίονα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση ανάμιξης άλλων σκευασμάτων να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας και να τηρείται μεγαλύτερη περίοδος της επέμβασης προ της συγκομιδής.

Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας

Ξεπλύνετε 3 φορές με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



K-40276/31601 - GREECE

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:



Picoxystrobin (πικοξυστρομπίν) 25 % β/ο

Πυκνό εναιώρημα (SC)

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

Εγγυημένη σύνθεση:
Picoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,3% β/β

Μυκητοκτόνο της ομάδας των στρομπιλουρίνων, με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60490/21.12.2015

1 Le

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας
152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700

Παρασκευαστής σκευάσματος:
DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Τυποποιητές- Συσκευαστές:
1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. Phyteurop, Γαλλία



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να χρειαστεί χορήγηση ενεργού άνθρακα ή/και καθαρτικού.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να χρειαστεί χορήγηση ενεργού άνθρακα ή/και καθαρτικού.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Να μην εφαρμόζεται μέσω του συστήματος άρδευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το rixochystrobin είναι ένα μυκητοκτόνο της ομάδας των στρομπιλουρινών, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Κινείται διασυστηματικά, διελασματικά και μέσω ατμών. Η εκλεκτικότητα του, η ισχυρή του δράση και η διατήρηση του πράσινου χρώματος της φυλλικής επιφάνειας που επιφέρει (καθυστέρηση της γήρανσης) επιδρά θετικά στην απόδοση των καλλιεργειών. Ελέγχει ασθένειες φυλλώματος και στελέχους στο ρύζι. Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Ανακινήστε καλά την φιάλη. Αφού θα έχετε γεμίσει περίπου το ένα τρίτο του δοχείου του ψεκαστήρα, αδειάστε την επιθυμητή ποσότητα ACANTO® απευθείας στο βυτίο, διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα.

.Χρησιμοποιήστε δοσομετρική συσκευή όπου είναι δυνατόν για ακριβή μέτρηση της δόσης Γεμίστε το βυτίο με την υπόλοιπη ποσότητα νερού. Κρατήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία ενώ ψεκάζετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ρύζι:

Για την καταπολέμηση των *Pyricularia oryzae* και *Helminthosporium* spp. συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 100 κ.εκ./στρέμμα από το στάδιο του φουσκώματος (μετά την

πλήρη έκπτυξη του φύλλου «σημαία») έως το άνοιγμα (σκίσιμο) του κολεού (πριν την εμφάνιση της ταξιανθίας) όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ψεκασμός φυλλώματος με κατεύθυνση προς το έδαφος όταν τα τηγάνια δεν έχουν νερό.
2. Μετά την εφαρμογή, σε περίπτωση εισχώρησης νερού, αυτό πρέπει να παραμείνει στα τηγάνια για χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ημερών.
3. Οι εφαρμογές γίνονται προληπτικά ή στα αρχικά στάδια της ασθένειας.