

## VOLET INTERNE RECTO (SIDE 7)

ελμινθοσπορίωσης (*Helminthosporium tritici-repentis*) και του υιδίου (*Erysiphe graminis*) και συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65). Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 21-28 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με προβλήματα αποστράγγισης.
3. Για την προστασία των γαιοσκωλήκων, το έδαφος πρέπει να οργώνεται σε βάθος 20 cm.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό μυκητοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων μυκήτων στα χρησιμοποιούμενα μυκητοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Ένας βιότυπος θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο μυκητοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμειξη) μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν περισσότερες από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21-28 ημέρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

Για όλες τις καλλιέργειες: 35 ημέρες

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Αδειάστε τον εξοπλισμό. Ξεπλύνετε καλά το δοχείο του εξοπλισμού εφαρμογής, τη ράβδο και τους σωλήνες με καθαρό νερό. Αφαιρέστε όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε ξανά όλο τον εξοπλισμό με καθαρό νερό. Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

## (SIDE 1) FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το Acanto® Plus είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται για την προστασία της καλλιέργειας σιτηρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να γίνεται δοκιμή σε μικρή έκταση πριν τη χρήση.

Η ανάμειξη στο βυτίο να γίνεται με την παρακάτω σειρά, δίνοντας χρόνο για την πλήρη διασπορά του μείγματος μετά την προσθήκη κάθε προϊόντος: υδατοδιαλυτός σάκος → υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) → υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG) → βρέξιμη σκόνη (WP) → Acanto® Plus / άλλο συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) → εναιώρημα - γαλάκτωμα (SE) → γαλάκτωμα σε νερό (EW) → γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) → πυκνό υδατοδιαλυτό υγρό (SL) → ανοσοενισχυτικό, επιφανειοδραστικό, λάδι → υδατοδιαλυτό λίπασμα → προϊόντα με χαμηλή διασπορά ψεκασμού.

**Οδηγίες για τον χειριστή**

Ο χειριστής πρέπει να φοράει κατάλληλη ατομική προστατευτική ενδυμασία για τον κορμό και τα πόδια, γάντια νιτριλίου πάχους 0,4-0,7 mm για τα χέρια και χημική προστατευτική μάσκα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ανάμειξης / πλήρωσης. Να φοράτε την ατομική χημική προστατευτική ενδυμασία και τα γάντια και κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Για εφαρμογές με τρακτέρ χωρίς καμπίνα, να χρησιμοποιείτε μάσκα με φίλτρο A2/P2 και προστατευτική ενδυμασία τύπου 5 και 6 (EN ISO 13982-2/EN13034).

Για την προστασία των ματιών, να φοράτε γυαλιά ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN166. Μετά την εφαρμογή του Acanto® Plus, βγάλτε τα ρούχα εργασίας και στη συνέχεια πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας με σαπούνι και νερό. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

**Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



## (SIDE 3) FACE PRINCIPALE RECTO (SIDE 4)

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Η δηλητηρίαση μπορεί να επιφέρει:** Ερεθισμό των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος.

**Δερματίτιδα εξ επαφής και ευαισθητοποίηση.**

**Αντίδοτο:** Συμπτυματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.**

K-40208/31511 - GREECE

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**  
**ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:**



**Picoxystrobin (πικοξυστρομπίν) 20 % β/ο**  
**Cyproconazole (συπροκοναζόλ) 8% β/ο**

**Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

**1 L e**

**Εγγυημένη σύνθεση:**

**Picoxystrobin 20% β/ο**  
**Cyproconazole 8% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες 74,93% β/β**  
**Περιέχει**  
**1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona**

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**


ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60484/9.11.2015

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:  
**NTY PONT ELLAS A.E.**  
Ύδρας 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 280  
152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα - Τηλ.: 210 688 9700

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

Παρασκευαστής σκευάσματος:  
DuPont International Operations Sàrl, Ελβετία  
Βάλε την φράση με μικρότερα γράμματα εδώ

Τυποποιητές- Συσκευαστές:  
1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία  
2. Phyteurop, Γαλλία



- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
- Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης.)
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**P. 660 P. 186 P. 151 BLACK**

## VOLET PRINCIPAL VERSO (SIDE 8)

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Η δηλητηρίαση μπορεί να επιφέρει:**

Ερεθισμό των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος

Δερματίτιδα εξ επαφής και ευαισθητοποίηση

Αντιδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το Acanto® Plus είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο μεγάλου φάσματος ασθενειών φυλλώματος σε καλλιέργειες σιτηρών, που συνδυάζει τη δραστική ουσία ricekystrobin, η οποία ανήκει στην ομάδα των στροβιλουρινών και τη δραστική ουσία cyproconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα των τριαζολών.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα κατά το ½ της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό και θέστε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα Acanto® Plus και, ανάλογα με την περίπτωση, το προϊόν ανάμειξης με τη σειρά που αναφέρεται κατωτέρω και, στη



## VOLET INTERNE VERSO (SIDE 9)

συνέχεια, συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Το μείγμα πρέπει να είναι υπό συνεχή ανάδευση πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

• Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να παραμείνει στο δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σταματήσει ο αναδευτήρας, αναδευίστε καλά το ψεκαστικό υγρό για 5 έως 10 λεπτά πριν την εφαρμογή.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Σιτάρι:**

Για την καταπολέμηση της σепτορίωσης (*Septoria tritici*), της καστανής σκωριάσης (*Puccinia recondita f.sp.tritici*), της κίτρινης σκωριάσης (*Puccinia striiformis*), του ιωδίου (*Erysiphe graminis*), της φουζαρίωσης (*Fusarium spp.*) και της ελμινθοσπορίωσης (*Helminthosporium tritici-repentis*) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65). Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

**Κριθάρι:**

Για την καταπολέμηση της ελμινθοσπορίωσης (*Pyrenophora teres*), του ιωδίου (*Erysiphe graminis*), της ρυγχοσπορίωσης (*Rhynchosporium secalis*) και της

σκωριάσης (*Puccinia hordei*) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου (BBCH 31-69). Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

**Βρώμη:**

Για την καταπολέμηση της σκωριάσης (*Puccinia coronata*) και του ιωδίου (*Erysiphe graminis*) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/ (BBCH 31-69). Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

**Σίκαλη:**

Για την καταπολέμηση της καστανής σκωριάσης (*Puccinia recondita*), της ρυγχοσπορίωσης (*Rhynchosporium secalis*), του ιωδίου (*Erysiphe graminis spp.secalis*) και της σепτορίωσης (*Septoria secalis*) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65). Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

**Τριτικάλε:**

Για την καταπολέμηση της καστανής σκωριάσης (*Puccinia recondita*), της ρυγχοσπορίωσης (*Rhynchosporium secalis*), της σепτορίωσης (*Septoria secalis*), της