

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 8226/23.07.2014

Κάτοχος άδειας διάθεσης στην αγορά -
Παρασκευαστής σκευάσματος:

Asahi Chemical Europe s.r.o., Czech Republic

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος, τηλ. 210 6725174

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Διανομέας:



NTY PONT ELLAS A.E.

Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής:

ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD, Japan

Συσκευαστές:

1. CHEMARK Kft., Ουγγαρία
2. LOVELA Terezín s.r.o., Τσεχία
3. CHEMCOSMETIC SERVICE s.r.o., Τσεχία
4. CLASSIC Oil s.r.o., Τσεχία

K-40377/31605 - GREECE



200 κ.εκ. e

Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση:

Sodium 5-nitroguaiacolate

Sodium o-nitrophenolate

Sodium p-nitrophenolate

Βοηθητικές ουσίες

0,3 % β/ο

0,6 % β/ο

0,9 % β/ο

98,20% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών.



3 576960 048293



- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαρβαίσιστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 8226/23.07.2014

Κάτοχος άδειας διάθεσης στην αγορά -
Παρασκευαστής σκευάσματος:

Asahi Chemical Europe s.r.o., Czech Republic

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος, τηλ. 210 6725174

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

- Διανομέας:



NTY PONT ELLAS A.E.

Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280

152 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής:

ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD, Japan

Συσκευαστές:

1. CHEMARK Kft., Ουγγαρία

2. LOVELA Terezín s.r.o., Τσεχία

3. CHEMCOSMETIC SERVICE s.r.o., Τσεχία

4. CLASSIC Oil s.r.o., Τσεχία



200 κ.εκ. e

Εγγυημένη σύνθεση:

Sodium 5-nitroguaiacolate

Sodium o-nitrophenolate

Sodium p-nitrophenolate

Βοηθητικές ουσίες

0,3 % β/ο

0,6 % β/ο

0,9 % β/ο

98,20% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών.



- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνεύετε σταγονίδια.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαρabaίστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

K-40377/31605 - GREECE

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιιεργειών.

Οδηγεί σε πρωίμηση και βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμοί φυλλώματός.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται

υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Οι εργάτες θα πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια εάν εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού:**

Για τη μείωση της ανθόρροιας και τη βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκάσμοι φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκάσμος πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 40-100

Ρύζι:

Για τη βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπώδεσης και για τη βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής πραγματοποιείται ένας ψεκάσμος φυλλώματος στην αρχή της άνθησης στη δόση των 8,5 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια):

Για την αύξηση της γονιμότητας της γύρης, την καλύτερη γονιμοποίηση,

το παρθενοκαρπικό δέσιμο, τη βελτίωση του μεγέθους & της ποιότητας των καρπών και την πρωιμότητα πραγματοποιούνται ψεκάσμοι φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκάσμος πραγματοποιείται 10 μέρες πριν την άνθηση, ο 2ος στην αρχή της άνθησης και οι επόμενοι ψεκάσμοι κάθε 10 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150

Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου:

Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκάσμοι φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκάσμος πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200

Πιπεριά Θερμοκηπίου:

Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκάσμοι

φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200

Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου:

Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: 3 ημέρες

Ρύζι: 90 ημέρες

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 14 ημέρες

Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: 3 ημέρες

Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: 3 ημέρες

Πιπεριά Θερμοκηπίου: 3 ημέρες

ATONIK[®] SL

ATONIK[®] SL

