

**u n** **5H4/Z3,1/S/14**  
**B/1103-140087**



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Αποφεύγετε να αναπνεύτε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα.
- Περιέχει Cytoxaπil, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

Γενική συμβουλή: Πατέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε ανείσθητο άτομο. Αν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία ή έχει σταματήσει, να γίνει τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Αν χρειαστεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή.

Καλέστε γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με τα δέρμα: Απομακρύνετε αμέσως όλα τα λερωμένα με το προϊόν ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμα και κάτω από τις βλεφαρίδες. Να κρατάτε τα μάτια σας ανοικτά κατά το ξέπλυμα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Συμβουλευτείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

**Προσοχή:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**Αμπέλι:** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*), ανικιστώνται εφαρμογές, στη δόση 200 γραμ./100 λίτρα νερό, που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4

**Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα**

**Πατάτα:** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) ανιστώνται εφαρμογές, στη δόση 200 γραμ./100 λίτρα νερό, όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. κι επαναλαμβάνονται ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4

**Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων.  
- Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται οι συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

- Σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια πατάτας (μετά το στάδιο κλεισίματος των γραμμών) οι εφαρμογές να γίνονται με το μεγάλο όγκο ψεκαστικού υγρού.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

■ Αμπέλι, Πατάτα: 21 ημέρες

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**


Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις ανιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

**Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 35°C) και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.



**DuPont™ Curzate® 3000 6/25 WG**

**Μυκητοκτόνο**

**cytoxaπil (συμοξανιλ) 60 g/kg**  
**μεταλλικός χαλκός 250 g/kg σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

© Σίμα κατατεθέν της Du Pont de Nemours (France) S.A.S.

Καθαρό βάρος:

**1 kg e**

**DuPont™**  
**Curzate® 3000 6/25 WG**

**Βρέξιμοι κόκκοι (WG)**

Εγγυημένη σύνθεση:

cytoxaπil .....6 % β/β

μεταλλικός χαλκός .....25 % β/β σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού

Βοηθητικές ουσίες .... 50,19 % β/β

**Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.**

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 60.190 /17-6-2008

Παρασκευαστής: **DuPont International Operations Sarl, Ελβετία**

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

**NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 &amp; Λεωφ. Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ: 210 688 9777 - 9778

Τυποποιητής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

02-02-71 K-34479/31407 - GREECE

