

Domark®

10 EC

Tetraconazole (Τετρακοναζόλη)
Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το DOMARK® είναι δισυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζόλην), με προληπτική, θεραπευτική και εξοικονομική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιόμυκητες, Ασκομυκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

Αμπέλι: Οξίδιο: Δύο προληπτικές εφαρμογές πριν την άνθηση (όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ.) και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών. Δόση: 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 12-14 ημέρες. **Νεκταρίνα:** Οξίδιο: Μέχρι τρεις προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πτώσης των πετάλων μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα του καρπού. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 10-14 ημέρες. **Αγγούρι:** Οξίδιο: Δύο έως τρεις προληπτικές μη διαδοχικές επεμβάσεις ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 10-14 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Διαχειρίση ανθεκτικότητας: Χρήση του DOMARK® 10 EC μόνο προληπτικά και σε συνδυασμό ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στα οποία ανήκει η τετρακοναζόλη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 14 ημέρες, Νεκταρίνα: 14 ημέρες, Αγγούρι: 7 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκαζομαι καλύτερα μέχρις απορροής. Να μην εφαρμόζεται με επινάτιο ψεκαστάρια.

Domark®

10 EC

Tetraconazole (Τετρακοναζόλη)
Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα προϊόντος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπομένεται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι αυτοτοξικό, αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και χωρίς υγρασία χώρο, μακριά από τηγή θερμότητας, σπύδα ή φλόγα. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τη χειραίρα. - Μην τρώτε, πιείτε, ή καπνίσετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα/μέσα στομικής προστασίας για το μάτι/πρόσωπο. - Μην ρυπνίζετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιεχόμενο: 50 κ.εκ.

Domark®

10 EC

Tetraconazole (Τετρακοναζόλη)
Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Tetraconazole: 10% (100gr/l)
Βοηθητικές ουσίες: 88,85% β/β

Δισυστηματικό Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοικονομική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αριθμ. Έγκρ. Κυκλ.: 6804/7-4-2000



ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εμφαλβές σε περίπτωση κατάποσης. - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Κατάχος έγκρισης:
ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21,
20153 Milan ITALY



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υ΄ορος 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9777, 9778

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πιείτε ή καπνίσετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άθουνο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άθουνο σαπούνι και νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι απαραίτητο. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777.**

Ημερομηνία Παραγωγής: βλέπε
Αριθμός Παρτίδας: συσκευασία

